

1. VETERINÆR PREPARATETS NAVN

Banminth vet. 2,2 % oralpasta til hund

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff

Pyrantel 21,62 mg per g pasta

Hjelpestoffer

Sorbitol, natriumalginat, silika, samt konserveringsmiddel:
propylparahydroksybenzoat (E216) og metylparabenoat (E218) og vann.

3. LEGEMIDDELFORM

Oralpasta

4. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

4.1 Farmakoterapeutisk gruppe: anthelmintikum ATC-kode QP52A F02

Farmakodynamiske egenskaper

Anthelmintikum tilhørende tetrahydropyrimidingruppen. Pyrantel har effekt mot både kjønnsmodne stadier og larvestadier av gastrointestinale nematoder.
Virkningsmekanisme: Påvirker parasittenes neuromuskulære transmisjon via stimulering av kolinerge neuroner. Dette forårsaker spastisk paralyse i parasittene. I anbefalt dose har pyrantel effekt mot over 90 % av adulte og L4- stadier av hundens nematoder.

4.2 Farmakokinetiske egenskaper

Pyrantelemonat er et tungt oppløselig salt og absorberes kun i liten grad fra tarmen. Den mengden som absorberes (maks.10 % i laboratorieforsøk på rotte og hund) metaboliseres raskt.

5. KLINISKE OPPLYSNINGER

5.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til

Hund

5.2 Indikasjoner

Mot spolorm: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*.

Mot hakeorm: *Ancylostoma spp*, *Uncinaria stenocephala*.

5.3 Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

5.4 Bivirkninger

Ingen kjente.

5.5 Forsiktighetsregler

Ingen spesielle.

5.6 Bruk under drektighet og laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

5.7 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner

Ingen kjente.

5.8 Dosering og administrasjon

Normal dosering er 14 mg pyrantelmonat per kg kroppsvekt.

Dette tilsvarer 0,67 g pasta.

Tube: Det gis 2 cm pasta per kg kroppsvekt.

En tube på 10 g rekker til 15 kg kroppsvekt. En tube på 24 g rekker til 36 kg kroppsvekt.

Den anbefalte mengden skal gis i en dose. Endring av den normale dietten er ikke nødvendig. Pastaen har god smak og kan blandes i foret.

Diende valper kan få pastaen direkte i munnen.

Vei gjerne hunden før behandling for å unngå feildosering. Preparatet virker på innvollsorm i tarmen.

Drektige tisper gis en ormekur 1 uke før og 1 uke etter valping.

Valpene behandles ved 1 ukes alder og siden hver fjortende dag ytterligere 4 ganger.

OBS ! Andre behandling skal skje senest 20. levedag.

Unghunder behandles ved 3 og 6 måneders alder ved behov.

Voksne hunder behandles en gang årlig.

Ved fastslått parasittinfeksjon behandles omgående, og behandlingen gjentas etter 14 dager.

5.9 Overdosering

Da pyrantelmonat absorberes i beskjedne grad er risikoen for overdosering veldig liten. Akutt LD₅₀ verdi er over 2000 mg/kg tilsvarende 138 ganger anbefalt dose.

5.10 Spesielle advarsler

Ingen.

5.11 Tilbakeholdelsestid

Ikke aktuelt.

5.12 Spesielle forsiktighetsregler for personer som håndterer preparatet

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Vesentlige uforlikeligheter

Ikke relevant.

6.2 Holdbarhet

3 år.

6.3 Oppbevaringsbetingelser

Skal ikke oppbevares over 25 °C.

6.4 Emballasje (type og innhold)

Tube: 10 g, 24 g, 5 x 24 g

6.5 Spesielle forholdsregler for håndtering av ubrukt legemiddel, rester og emballasje

Rester av legemiddel og legemiddel med utgått holdbarhet leveres til apotek.

**7. NAVN OG ADRESSE FOR INNEHAVER AV
MARKEDSFØRINGSTILLATELSE**

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark

8. FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK

Ikke relevant

9. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER

6038

10. MT-DATO FOR FØRSTE GANG/SISTE FORNYELSE

Første MT-dato: 1975-06-06

Siste fornyelse: 2010-04-13

11. OPPDATERINGSDATO

08.12.2021